

## דף מידע למטופל לפני בדיקת אולטראסאונד אנדוסקופי

בדיקת אולטראסאונד אנדוסקופי הינה בדיקה המשלבת אנדוסקופיה + אולטראסאונד באמצעות מכשיר צינורי גמיש אופטי המיוחד לצורך זה. הבדיקה משמשת כלי עזר אבחוני וטיפולי במצבי חולי של בלבב ודרכי מרה, דופן הוושט, הקיבה והתריסריון.

### אופן הבדיקה:

הבדיקה מתבצעת על ידי רופא גסטרואנטרולוג. לאחר קבלת הסבר לגבי מהות הבדיקה והשלכותיה, תתבקש/י לחתום על הסכמה מדעת. בתחילת הבדיקה תתבקש/י לשכב על צד שמאל, תחובר/י למכשירי ניטור על מנת לעקוב אחר מצב נשימה, קצב הלב ולחץ דם. בתחילת הבדיקה יוכנס לפיך מגן פלסטיק על מנת לשמור את הפה פתוח בזמן הבדיקה. תקבל/י זריקת חומרי הרדמה דרך הווריד. כאשר הינך מורדמת/ה רופא יחדיר את האנדוסקופ דרך הפה ויצפה באיברי מערכת העיכול הנבדקים.

### סיכונים:

הבדיקה הינה בטוחה אך קיים סיכון קטן מאוד לסיבוכים: התנקבות של דופן מערכת העיכול - שתצריך תיקון ניתוחי, דימום קל מאזור לקיחת ביופסיה, זיהום - שיצריך טיפול אנטיביוטי, תחושה של גירוי וכאב מקומי בלוע שתחלוף תוך יום - יומיים, סיבוכים מחומרי הרדמה, שלעיתים נדירות עלולים לגרום להפרעות בנשימה והפרעות בפעילות הלב, בעיקר אצל חולים עם הפרעות קודמות במערכת אלה. כמו כן, תיתכנה תגובות אלרגיות בדרגות שונות לחומר ההרדמה.

### התוויות לבדיקה:

חשד למחלת אבנים בדרכי המרה, דלקות חוזרות של הבלבב, חשד למחלות גידוליות של דרכי מרה ולבלבב, חשד לתהליכים תת ריריים בחלל מערכת העיכול, הערכת מידת חדירה של גידולים באזורים שונים במערכת העיכול, נטילת דגימות/ביופסיה.

### הכנה לבדיקה:

- ❖ צום 8 שעות לפני הבדיקה.
- ❖ עליך להביא תשובות עדכניות של בדיקת קרישיות - INR,PT,PTT, ספירת דם מלאה כולל תרומבוציטים.
- ❖ עליך להפסיק טיפול בתרופות נוגדות קרישה בשבוע הימים שלפני הבדיקה מאחר שלעיתים קרובות יש צורך בביצוע FNA (ביופסיות מחט) במהלך ה - EUS. עליך לעשות זאת בהתייעצות עם רופא מטפל ולבחון את הצורך בטיפול חלופי.
- ❖ במידה והנך נוטל/ת תרופות למחלות כרוניות (כמו: סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב) ניתן ליטול את התרופות עד שלוש שעות לפני הבדיקה, עם חצי כוס מים.

### הערות:

- ❖ הנך מוזמן/ת לשעה משוערת ונעשה כמיטב יכולתנו לקבלך בזמן, אך משך הבדיקות והטיפול לעיתים חורג מהתכנית הצפויה.
- ❖ עליך להצטייד בהתחייבות כספית מקופת החולים (טופס 17 לבדיקה).
- ❖ חובה להגיע עם מלווה לבדיקה, לא תתבצע בדיקה ללא ליווי.
- ❖ נהיגה אסורה בהחלט למשך 12 שעות לאחר הבדיקה.

### לאחר הבדיקה:

בסיום הבדיקה תועבר/י להשגחה בחדר התאוששות עד התעוררות, במשך שעה או יותר בהתאם לצורך. שתייה ואכילה מותרת לאחר התעוררות מלאה ובאישור הצוות המטפל. לפני השחרור הרופא המבצע ימסור את תוצאות הבדיקה, הוראות לטיפול ולהמשך מעקב.

\***לברורים או כאשר אין באפשרותך להגיע לבדיקה**, נא לפנות למזכירות המכון לטל-04-6304480 או לפקס 04-6304408.

בברכת בריאות שלמה  
צוות מכון גסטרו



המרכז הרפואי  
**הלל יפה**  
Hillel Yaffe  
Medical Center

המכון לגסטרואנטרולוגיה

ת.ד. 169, חדרה 38100 | טל. 04-6304480 | פקס. 04-6304408 | 04-6304408 | Tel. +972-4-6304480 | FAX. +972-4-6304408 | P.O.Box 169, Hadera 38100, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות  
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health