



הסבר על בדיקת

PEG

גסטרוסטומיה מלעורית

מכון גסטרואנטרולוגי


מרכז רפואי הלל יפה



המרכז הרפואי  
הלל יפה  
מומחים באנשים




# מה היא גסטרוסטומיה - PEG?





- זוהי פעולה כירורגית זעירה בה מוחדר צינור הזנה דרך דופן הבטן אל הקיבה.
- הפעולה נעשית באמצעות מכשיר אנדוסקופי גמיש.
- המכשיר האנדוסקופי מאפשר הסתכלות פנימה לצורך הכוונה של הפעולה הכירורגית.
- מאחר שמדובר בפעולה של החדרת מכשיר לתוך הגוף – הבדיקה מצריכה חתימה על הסכמה מדעת, לרוב באמצעות אפוטרופסות.

# כיצד נעשית הבדיקה?

- לפני הבדיקה מוזרק דרך הוריד חומר מרגיע הגורם לשינה קצרה.
- הבדיקה מבוצעת בשכיבה על הגב, בהרדמה.
- יוכנס אביזר פלסטי השומר את הפה פתוח ואת השיניים מוגנות.
- האנדוסקופ מוחדר דרך הפה.




# מהלך בדיקת ה - PEG



- הבדיקה אורכת כ - 15 דקות.
- במהלך הבדיקה נעשה מעקב אחר נשימה ודופק.
- הפעולה נעשית תוך חיטוי הבטן, בתנאים סטריליים.
- תחת הכוונת האנדוסקופ וביצוע חתך קטן בדופן הבטן מוחדר צינור ההזנה מבחוץ אל הקיבה, ומקובע בשני הצדדים ע"י כפתורי-מעצור.


# למי מיועדת הפרוצדורה?



- הזנה באמצעות גסטרוסטום יעילה:
- לחולים עם קשיי בליעה בעקבות פגמים אנטומיים או נוירולוגיים
- לחולים עם ירידת משקל קיצונית, שאינם מסוגלים לאכול במידה המספקת לצרכי הגוף

# סיבוכים הקשורים ב-PEG:


יתכנו סיבוכים כתוצאה מהפעולה החודרנית:



- נזק לשיניים מתנדנדות
- השתנקות ושאיפת רוק/מזון
- כאב בגרון אחרי הפעולה
- דימום או קרע שיצריכו התערבות ניתוחית
- תגובת רגישות לחומר ההרדמה
- זיהום בעור או בחלל הבטן
- נדידת צינור ה-PEG
- דליפה סביב הצינור
- סתימה בצינור
- יש לציין שידועה תמותה גבוהה יחסית בחודש שלאחר הפרוצדורה, במיוחד אצל חולים

מבוגרים עם מחלה דלקתית חריפה.

# כיצד להיערך לבדיקה?



- ✓ יש לשמור על צום - 8 שעות לפני הבדיקה.
- ✓ יש לתת טיפול מונע באנטיביוטיקה – שעה לפני הפעולה. בהוראת רופא מטפל יש להזריק מנת מונצף 1 גרם, או אנטיביוטיקה אחרת במידה שידועה רגישות.
- ✓ יש להגיע עם מלווה.
- ✓ יש להביא בדיקות דם עדכניות: ספירת דם, INR.

# עוד הכנות לבדיקה



יש להפסיק תרופות מדללות דם 7 ימים לפני הבדיקה. יש לעשות זאת בהתייעצות עם רופא מטפל, בהתאם למחלות הרקע.

לבעלי קוצב לב – יש להביא את כרטיס פרטי הקוצב.

במטופל שאינו בר הסכמה - יש להצטייד בצו מינוי אפוטרופוסים ותעודת הזהות.

החתמה על הסכמה מדעת ע"י האפוטרופוס חייבת להתבצע במכון הגסטרו, ביום הבדיקה או במהלך השבוע לפניה, בתיאום מראש.



# אחרי הבדיקה:



- ✓ יש לתת את התזונה דרך צינור כשהגוף בתנוחה גבוהה (לא בשכיבה).
- ✓ יש לחטא את הפצע בדופן הבטן יומיומית ע"י החלפת חבישה ומריחת משחת פולידין או משחה אנטיביוטית, עד לריפוי.
- ✓ יש להקפיד שהצינור לא ינדוד פנימה או החוצה – לשים לב למיקומו הראשוני לפי הסימון המספרי עליו, ואם זז ממקומו יש להשיבו לפי הסימון.
- ✓ לאחר 4 שעות אפשר לתת מים דרך הצינור ואחר כך להאכיל בכלכלה נוזלית.
- ✓ יש להתייעץ עם דיאטנית באשר לתרכובות ההזנה וכמותן.
- ✓ לאחר כל האכלה יש לשטוף את צינור ה- PEG במים נקיים.

# המשך השגחה וטיפול:




✓ אם חל שינוי לרעה במצב הבריאותי של המטופל (חום, הקאות, כאב בטן, סימני דלקת בעור, או הידרדרות אחרת) - נא לפנות לבדיקה במיון.

✓ החלפת PEG ראשוני היא כעבור כחצי שנה, או לפני מצב הבלאי של הצינור.

✓ אם הצינור נסתם או דולף, בלוי או קרוע – נא לפנות אלינו בהקדם להחלפתו.

# המשך השגחה וטיפול:



**אם הצינור נשלף ממקומו והוא חדש (עד 3 שבועות מיום הכנסתו):**

יש לחבוש את המקום ולתאם תור להכנסת צינור חדש. בינתיים יש לדאוג להזנת המטופל בזונדה.


**אם הצינור נשלף ממקומו והוא ישן (מעל 3 שבועות מיום הכנסתו):**

ניתן להכניס צינור פולי זמני ( ע"י רופא, או אח/אחות בעל/ת הרשאה) ולתאם תור להחלפת הצינור לחדש.


# המשך השגחה וטיפול:

לידיעה, הצינור השני שונה במבנהו מהצינור הראשוני והוא מוחלף דרך התעלה שנוצרה בדופן הבטן

ראשוני



שני



צוות מכון הגסטרואנטרולוגיה מאחל לכם  
בריאות שלמה ובהצלחה!