



המרכז הרפואי
הלל יפה
מומחים באנשים

דף מידע למטופלים ובני משפחותיהם

הרחבה של חצוצרת השמע- EUSTACHIAN TUBE



החלמה מהירה ורפואה שלמה,
צוות המחלקה לאף-אוזן-גרון
וכירורגית ראש צוואר.

בכל שאלה ניתן לפנות לטלפון: 04-7748639

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ביום קבלתך למחלקה עליך להביא עמך:

- טופס 17 לאשפוז
- רשימת תרופות שהנך נוטל/ת באופן קבוע
- בדיקות דם
- בדיקות שמיעה
- אם קיים CT

ערב הניתוח:

מותרת לך כלכלה רגילה, אך עליך להיות בצום מוחלט מהשעה (גם לא לשותות) מהשעה 24:00

בוקר הניתוח:

תרד/י לחדר ניתוח על מיטתך.

לאחר הניתוח:

- לאחר הניתוח תשהה/י בחדר התאוששות מספר שעות
- חזרתך למחלקה תהיה לקראת הצהריים
- כעבור שעתיים מותרת לך שתייה קלה בהדרגה וארוחת ערב קלה
- ניתן לקבל משככי כאבים לפי הצורך
- לאחר הניתוח אין לפמפם ולקנח את האף 3 ימים

תופעות לוואי או סיבוכים:

יכולה להופיע תחושת לחץ שתחלוף

הנחיות לאחר הניתוח:

- ליטול תרופות נגד כאבים לפי הצורך
- להגיע לביקורת במרפאתנו עם בדיקת שמיעה חוזרת
- במועד שנקבע.

מהו אי תפקוד של תעלת חצוצרת השמע?

תעלת השמע, או בשמה הקליני חצוצרת אוסטכיוס, הינה תעלה המחברת את האוזן התיכונה אל החלק האחורי של האף (הלוע) ומאפשרת כניסה של אוויר לתוך האוזן וממנה. התפקוד העיקרי של התעלה הינו השוואת לחצי ■ והגנה על האוזן התיכונה ואוורורה. רובנו מכירים בחשיבות תעלה זו במצבים של נסיעה בכבישים תלולים, טיסות או צלילות הגורמים לתחושת אטימות באוזניים. באי תפקוד של תעלת חצוצרת השמע פעולות חשובות אלו לא מתקיימות.

הסימפטומים

- תחושת "מלאות" תמידית באוזן
- חוסר יכולת לסבול שינויים בלחץ האוויר בטיסות, צלילות או פעילויות אחרות
- ירידה בשמיעה
- רעשים באוזניים
- הרגשה של חוסר שיווי משקל

תהליך הניתוח:

הניתוח נעשה בגישה אנדוסקופית דרך האף. נעשה שימוש בבלון, שמוחדר לתעלת השמע בטכניקת צנתור המאפשרת הרחבת החלק הסחוסי של תעלת אוסטכיוס דרך החלק האחורי של האף. הבלון מנופח בלחץ למשך זמן קצר ולאחר מכן מוצא החוצה. מדובר בשיטה בטוחה יחסית, עם מעט תופעות לוואי, המהווה טיפול ישיר בבעיה ומשפרת את תפקוד תעלת השמע. ביצוע הפעולה דורשת מהמטופלים להיות תחת הרדמה, אך אורך הפעולה קצר ביותר - כרבע שעה, כאשר המטופלים, לרוב, משוחררים לביתם לאחר מספר שעות וחוזרים לתפקוד רגיל יום לאחר ביצוע הפעולה.