

דף ריכוז תופעות לוואי שכיחות

טיפול סימפטומטי	תופעת לוואי
לרוב מופיעה 3-5 ימים כעבור התחלת טיפול כימותרפי. מומלץ תרגילי פיזיותרפיה והליכה	חולשה
Tab Zofran 8 mg x 2/day and/or Tab Pramin 10 mg x 3/day בהעדר שיפור נא לפנות לחדר מיון	בחילה, הקאה
Tab Loperamid (Stopit) 2-4 mg x 1-3/day מנה מכסימלית 16 מג/יום במידה ואין שיפור במצב במשך 3-6 שעות או קיימת החמרה- נא לפנות לחדר מיון באופן דחוף	שלשול
נא לפנות לרופא/חדר מיון באופן דחוף	עליה חדה ברמת קריאטינין (creatinine) בדם / אי-ספיקת כליות
Tab Acamol 1 gr נא לפנות לרופא משפחה / חדר מיון באופן דחוף	חום מעל 38 מעלות
לרוב מתחילה תוך 1-2 שבועות מהתחלת טיפול כימותרפי	נשירת שיער
Sol. Nystatin 1 cc x 3/day שטיפת פה אחרי האוכל במידה ואתה לא מסוגלת לבלוע ו/או לשתות – נא לפנות לחדר מיון באופן דחוף	קשיי בליעה ופצעים בפה (מוקוזיטיס)
לפנות לרופא משפחה. מומלץ ביצוע בדיקת EMG ובדיקה של נירולוג. במידה וסמני שיתוק בגפה נא לפנות דחוף לחדר מיון	נירופטיה פריפרית נימול או ירידה בתחושה בקצות אצבעות
נשים: לפני התחלת הטיפול הכימותרפי מומלץ לקבל ייעוץ במרפאת פוריות גברים: לפני התחלת הטיפול הכימותרפי מומלץ לבצע שימור זרע	פגיעה בפוריות
מדידת חום סיסטמי שלוש פעמים ביום, תנאי בידוד בית. לבצע ספירת דם כול 3 ימים עד התאוששות הבדיקה. בעליית חום מעל 38 מעלות, נא לפנות לחדר מיון באופן דחוף	נויטרופניה (neutropenia) בספירת דם Neutr < 1500

במידה יש שינוי חד במצב החולה, נא לפנות לבדיקת רופא משפחה/או חדר מיון באופן דחוף

***הפניה לחדר מיון הקשורה למחלה הממארת פטורה מצורך להתחייבות קופת החולים**

ניתן להתייעץ טלפוני :

עם צוות אשפוז יום-אונקולוגיה בימים א-ה בין שעות 8.00-15.00 בטלפון 04-6304969

עם צוות סיעודי אשפוז פנימית ד-אונקולוגיה בשעות ערב/לילה, חגים ושבבות

בטלפון 04-6308350

צוות המחלקה מאחל לך הצלחה והחלמה מהירה! נשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אונקולוגיה מרפאה (מזכירה) - בימים א'-ה', בין השעות 8:00-12:00 טלפון: 046188280, פקס: 04-6304994